

STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Messina 13.04.2001

SIGNOR MARCO GIUSEPPE
Esame ecotomografico epatobiliare.

Fegato nei limiti volumetrici della norma, a margini policiclici, disomogeneo per la presenza di spot ecogeni nella sede della neoformazione già segnalata. La porzione più ventrale di questa area è ipoecogena per mm 30x15, irregolarmente vascolarizzata, da interpretare come persistenza di malattia.

Non dilatazione delle vie biliari. Colecisti non identificabile. Presenza di echi nel lume della v. porta, che ha un calibro di mm 12.

Presenza di modesto versamento in sede periepatica e, soprattutto, nello scavo pelvico (ascite).



Prof. Dott. Anselmo Minerva

CAI Primario Radiologo Ospedale «Piemonte»

VIA G. BRUNO, 35 - ANGOLO P.ZZA CAROLI TEL. 090/571.22111 NA

RADIOLOGIA GENERALE - MAMMOGRAFIA - ISTEROSALPINGOGRAFIA - TELECRANIO CON CEFALOSTATO
ECOGRAFIA - ECOCARDIOGRAFIA - XERORADIOGRAFIA - TELETERMOGRAFIA - SENOLOGIA